

período de 3 a 6 meses para garantir o sucesso do tratamento. **pantogar**® não é indicado para alopecia cicatricial ou androgenética/convencional (calvície masculina). Entretanto, nestes casos, **pantogar**® pode fortalecer os cabelos remanescentes.

Se os sintomas persistirem ou se o objetivo do tratamento não for alcançado, o paciente deve ser orientado a procurar o médico.

Este medicamento deve ser administrado somente pela via recomendada para evitar riscos desnecessários.

Gravidez – Recomenda-se que **pantogar**® seja utilizado apenas na segunda metade da gestação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação – Não são conhecidas restrições para o uso do produto durante a lactação.

Pediatria – Não se recomenda o uso do produto por crianças menores de 12 anos de idade, uma vez que não foram realizados estudos específicos para esta faixa etária.

Geriatría (idosos) – Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes idosos.

Insuficiência renal/hepática – Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes com insuficiência renal ou hepática.

• **Grupos de risco:** Recomenda-se que **pantogar**® seja usado apenas na segunda metade da gestação. Não se recomenda o uso de **pantogar**® em crianças com menos de 12 anos de idade. Para os demais grupos de risco (lactação, geriatria, insuficiência renal/hepática) não são conhecidas restrições para seu uso.



Interações medicamentosas: Não são conhecidos relatos de interação de **pantogar**® com outros medicamentos, alimentos, tabaco ou álcool. Entretanto, recomenda-se evitar o uso de **pantogar**® com sulfonamidas. Como as sulfonamidas exercem seu efeito antimicrobiano através da inibição competitiva do ácido aminobenzóico bacteriano, o uso de ácido aminobenzóico concomitantemente com sulfonamidas pode interferir na inibição competitiva e antagonizar os efeitos antibacterianos das sulfonamidas. Também não são conhecidos relatos de interferência de **pantogar**® nos resultados de exames laboratoriais.



Reações adversas: *Foram relatados raros casos de reações de intolerância ao medicamento, tais como: sudorese repentina, pulso acelerado, reações*

dermatológicas como coceira e urticária ou desconforto gastrointestinal como queimação, náuseas, gases e dor abdominal.

ATENÇÃO: Este produto é um novo medicamento e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, podem ocorrer efeitos indesejáveis não conhecidos. Se isto ocorrer, o médico responsável deve ser comunicado.



Superdose:

Não são conhecidos relatos de superdosagem com **pantogar**®. Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

• **Armazenagem:** Mantenha **pantogar**® em temperatura ambiente (15 a 30°C), protegido da umidade.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Registro MS – 1.0974.0196

Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior - CRF-SP nº 5143

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho/rótulo.

Fabricado e distribuído sob licença de Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt/Alemanha por:

BiOLAB

BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda.
Av. Paulo Ayres, 280 - Taboão da Serra - SP
CEP 06767-220 - SAC 0800 724 6522
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

EE 022187 B



pantogar®

queratina + cistina + associações



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

• **Forma farmacêutica:**

Cápsula.

• **Via de administração:**

Via oral.

• **Apresentações:**

Caixa com 30 e 90 cápsulas.

• **USO ADULTO OU PEDIÁTRICO** (crianças maiores de 12 anos).

• **Composição:**

Cápsula

Cada cápsula contém:

pantotenato de cálcio	60 mg
cistina	20 mg
nitrito de tiamina	60 mg
levadura medicinal	100 mg
queratina	20 mg
ácido aminobenzóico	20 mg
Excipientes: celulose microcristalina, talco, estearato de magnésio, povidona, dióxido de silício.	



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• **pantogar**® exerce um efeito positivo sobre o crescimento dos cabelos e das unhas, assim como sobre a cor dos cabelos.

• **Indicações do medicamento:** Perda de cabelo por razões desconhecidas. Cabelo enfraquecido, fino, não maleável, quebradiço, sem vida, opaco e sem cor, cabelos danificados pela luz do sol e radiação UV, prevenção do aparecimento de fios brancos. Unhas quebradiças, rachadas e pouco maleáveis.

• **Riscos do medicamento:**

Contra-indicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Advertências e precauções: Uma vez que a formação dos cabelos ocorre lentamente, é importante tomar **pantogar**, regularmente na dose prescrita por um período de 3 a 6 meses para garantir o sucesso do tratamento. **pantogar** não é indicado para alopecia cicatricial ou androgenética/convencional (calvície masculina). Entretanto, nestes casos, **pantogar** pode fortalecer os cabelos remanescentes. A alopecia cicatricial se caracteriza pela ausência ou diminuição definitiva dos pêlos, podendo ser causada por traumas, queimaduras químicas ou físicas, infecções por fungos, bactérias, vírus ou outros parasitas, câncer interno e doenças, tais como: líquem plano pilar, lupus eritematoso, esclerodermia, mucinose folicular.

Se os sintomas persistirem ou se o objetivo do tratamento não for alcançado, consulte seu médico.

Principais interações medicamentosas e/ou alimentos: Não são conhecidos relatos de interação de **pantogar** com outros medicamentos, alimentos, tabaco ou álcool. Entretanto, caso tenha sido tratado com um medicamento que contenha uma sulfonamida (por exemplo: sulfabenzamida, sulfacetamida, sulfacloropiridazina, sulfacrisoidina, sulfadiazina, sulfametoxazol), informe seu médico antes de usar **pantogar**.

Principais interações com testes laboratoriais: Não são conhecidos relatos de interferência de **pantogar** nos resultados de exames laboratoriais.

Restrições a grupos de risco:
Gravidez – Recomenda-se que **pantogar** seja utilizado apenas na segunda metade da gestação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Lactação – Não são conhecidas restrições para o uso do produto durante a lactação.
Pediatria – Não se recomenda o uso do produto por crianças menores de 12 anos de idade, uma vez que não foram realizados estudos específicos para esta faixa etária.
Geriatría (idosos) – Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes idosos.
Insuficiência renal/hepática – Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes com insuficiência renal ou hepática.

• Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

• Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

• Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

• **Modo de uso:**
Características do medicamento: Cápsulas de gelatina dura, contendo pó bege pardo, de odor característico.

Modo de usar e Posologia: Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo:
Adultos: 1 cápsula, 3 vezes ao dia, por via oral.
Crianças maiores de 12 anos de idade: 1 a 2 cápsulas ao dia, de acordo com a idade, por via oral.
A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento pode ser continuado ou repetido.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

• **Reações adversas:** *Foram relatados raros casos de reações de intolerância ao medicamento, tais como: aumento repentino do suor, pulso acelerado, reações dermatológicas como coceira e urticária ou desconforto gastrointestinal como queimação, náuseas, gases e dor abdominal.*

ATENÇÃO: Este produto é um novo medicamento e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, podem ocorrer efeitos indesejáveis não conhecidos. Se isto ocorrer, o médico responsável deve ser comunicado.

• **Conduta em caso de superdose:**
Não são conhecidos relatos de superdosagem com **pantogar**. Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, procurar auxílio médico.

• **Cuidados de conservação e uso:**
Mantenha **pantogar** em temperatura ambiente (15 a 30°C), protegido da umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

• **Características Farmacológicas:** **pantogar** é um medicamento oral para cabelos e unhas. **pantogar** fornece as substâncias fortificantes pantotenato de cálcio e cistina (aminoácido) aos cabelos e às unhas. Também contém a proteína queratina que é o mais importante componente do cabelo. **pantogar** apresenta efeitos vantajosos em vários casos de perda difusa de cabelo. É observada uma melhora no crescimento dos cabelos, tanto em relação ao número de cabelos perdidos espontaneamente como em relação à análise das raízes. **pantogar** melhora a estrutura do cabelo, aumenta a resistência do cabelo aos danos mecânicos e químicos e aos danos causados pela luz do sol e fortalece os cabelos. As desordens de crescimento das unhas melhoram consideravelmente com o tratamento com **pantogar**. As unhas se tornam menos quebradiças e sua maleabilidade aumenta.

 **Indicações:** Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões desconhecidas). Alterações degenerativas na estrutura de cabelo (cabelo enfraquecido, fino, não maleável, quebradiço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela luz do sol e radiação UV, prevenção do aparecimento de fios brancos. Desordens no crescimento das unhas (unhas quebradiças, rachadas e pouco maleáveis).

 **Contra-indicações:** *Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.*

• **Modo de Usar e Cuidados de Conservação Depois de Aberto:** Via oral. Ingerir o medicamento durante as refeições com um pouco de líquido, sem mastigar.

 **Posologia:**
Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo:
Adultos: 1 cápsula, 3 vezes ao dia, por via oral.
Crianças maiores de 12 anos de idade: 1 a 2 cápsulas ao dia, de acordo com a idade, por via oral.
A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento pode ser continuado ou repetido.

 **Advertências: Gerais** – Uma vez que a formação dos cabelos ocorre lentamente, é importante tomar **pantogar** regularmente na dose prescrita por um