

TAMARINE

FARMASA

Atualizado em 09/12/2014

Composição de Tamarine

cada 5 g contém: pó de folha de sena 400 mg; cássia fistula 19,50 mg; tamarindus indica 19,50 mg; coriandrum sativum 9,00 mg; alcaçuz 4,00 mg. Excipiente q.s.p. 5 g. Cada cápsula contém: pó de folha de sena 240,00 mg; cássia fistula 11,70 mg; tamarindus indica 11,70 mg; pó de coriandrum sativum 5,40 mg. Excipiente q.s.p. 270,00 mg.

Posologia e Administração de Tamarine

geléia: adultos: 1 colher das de chá (5 gramas) após a última refeição. Cápsulas: adultos: 1 ou 2 cápsulas após a última refeição ou segundo critério médico. Geléia: crianças: 1 colher das de café (2,5 gramas) após a última refeição. Cápsulas: crianças acima de 12 anos: 1 cápsula após a última refeição ou segundo critério médico.

Reações Adversas de Tamarine

podem ocorrer esporadicamente cólicas abdominais, vômitos ou diarreias que desaparecem com a suspensão da medicação ou ajustamento da dose.

Contra-Indicações de Tamarine

rectocolites e doença de Crohn. Em crianças, só usar quando houver indicação médica.

Indicações de Tamarine

perturbação organofuncional da motricidade intestinal; tratamento sintomático da constipação; tanto crônica como secundária; preparação para os exames radiológicos e endoscópicos. Indicações terapêuticas complementares: constipação decorrente de viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas, pós-operatórios, acidentes vasculares cerebrais.

Apresentação de Tamarine

geléia: potes com 150 g e 250 g. Cápsulas: blister com 20 cápsulas.



Ver informações do laboratório