

P&D - DE	DATA:
AR	DATA:
DM	DATA:

Produto:	Hixizine	Cód. Produto Acabado:	111300006/ 111300007
Material:	Bula Hixizine Xarope/ Com	Cód. de Material:	103000420.B
Status:	<input type="checkbox"/> Circulação <input checked="" type="checkbox"/> Revisão: 02	<input checked="" type="checkbox"/> Finalizado	Data: 16/12/10
Elaborador:	Tatiane Marcondes		Data: 13/12/10

Hixizine®

dicloridrato de hidroxizina

INDICAÇÕES: HIXIZINE® é o anti-histamínico de eleição no tratamento de dermatite atópica e urticária. É indicado no tratamento sintomático de condições alérgicas pruriginosas da pele diversas, tais como: urticária, dermografismo, dermatite atópica e de contato e prurido decorrente de outras doenças sistêmicas.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à hidroxizina e início da gestação. **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:**

GESTAÇÃO/LACTAÇÃO: Categoria C pelo FDA. Não foram realizados estudos controlados em humanos. Entretanto, o uso da hidroxizina não é recomendado nos primeiros meses da gestação, já que estudos realizados em ratos demonstraram que doses acima das terapêuticas, podem estar relacionadas com anormalidades fetais. Não é conhecido se a hidroxizina é excretada no leite materno, nem o potencial de efeitos adversos sobre o lactante. Sua administração na gravidez e lactação deve ser realizada caso os benefícios justifiquem os riscos.

REAÇÕES ADVERSAS: Sedação, sonolência (geralmente transitórias) e secura na boca. Raramente podem aparecer crises convulsivas, tremor ou agitação. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Potencialização dos depressores do sistema nervoso central: hipnóticos, anestésicos, álcool. Potencialização dos efeitos atropínicos quando associada a: anticolinérgicos, anti-histamínicos, neurolépticos e antidepressivos imipramínicos. Apomorfina: Pode ocorrer diminuição do efeito emético da apomorfina em tratamentos de intoxicações.

POSOLOGIA: XAROPE: HIXIZINE® xarope é apresentado com seringa-dosadora e bico adaptador. 6 a 8 Kg - dose antihistamínica: 2,0 a 3,0 mL de Hixizine® xarope / tomada; de 8 a 10 Kg - dose antihistamínica: 3,0 a 3,5 mL de Hixizine® xarope / tomada; de 10 a 12 Kg - dose antihistamínica: 3,5 a 4,0 mL de Hixizine® xarope / tomada; de 12 a 24 Kg - dose antihistamínica: 4,0 a 8,5 mL de Hixizine® xarope / tomada; de 24 a 40 Kg - dose antihistamínica: 8,5 a 14,0 mL de Hixizine® xarope / tomada . Crianças: 0,7 mg/kg de peso, 3 vezes ao dia. **COMPRIMIDOS:** Adultos: 1 comprimido (25mg), 3 a 4 vezes ao dia. Crianças: 0,7 mg/kg de peso, 3 vezes ao dia. Quando desejar efeito sedativo como pré-medicação anestésica ou após anestesia geral: 50-100mg para adultos; 0,6mg/kg para crianças. É aconselhável que pacientes com problemas gástricos tomem os comprimidos junto com a alimentação. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.** MS1.0191.0256